

En tant qu'infirmier(e) libéral(e), vous êtes en première ligne pour **suivre les patients fragiles atteint de Covid à domicile**. Des traitements par anticorps monoclonaux contre le Covid sont mis à disposition sur le marché.



### A qui pouvez-vous administrer le traitement Evusheld®?

Ce traitement est indiqué chez les **patients adultes à très haut risque de forme sévère et faiblement ou non répondeurs à la vaccination** après un schéma vaccinal complet OU non éligibles à la vaccination.



### Dans quelles conditions le traitement doit-il être administré ?

- Tout traitement par Evusheld® (tixagévimab 150 mg /cilgavimab 150 mg) **doit être administré et supervisé par un professionnel de santé**.
- **Une surveillance de 30 mins** doit être respectée après administration pour écarter tout risque de réaction allergique.



### Comment administrer le traitement Evusheld® ?

- Administration par voie intramusculaire de **300 mg de l'association de tixagévimab et de cilgavimab**.
- Elle est effectuée consécutivement à **deux points d'injection distincts**.



### Quel suivi post-traitement Evusheld® ?

La durée de protection au Covid est d'au moins 6 mois. **Un suivi du dosage des anticorps tous les 3 mois doit être organisé** afin de confirmer le délai de renouvellement du traitement.

Les patients sous traitement doivent être testés contre la Covid en cas de positivité ou de présentation symptomatique évocatrice de Covid-19.



### Comment le traitement Evusheld® est facturé ?

Administration en intramusculaire et surveillance de 30 mins : **AMI 3 + MCI**

Télécharger le [DGS-Urgent N°2022-03](#)