

En tant qu'infirmier(e) libéral(e), vous êtes en première ligne pour **suivre les patients fragiles atteint de Covid à domicile**. Des traitements par anticorps monoclonaux contre le Covid sont mis à disposition sur le marché.



### **A qui pouvez-vous administrer le traitement Evusheld®?**

Ce traitement est indiqué chez les **patients adultes à très haut risque de forme sévère et faiblement ou non répondeurs à la vaccination** après un schéma vaccinal complet OU non éligibles à la vaccination.



### **Dans quelles conditions le traitement doit-il être administré ?**

- Tout traitement par Evusheld® (tixagévimab 150 mg /cilgavimab 150 mg) **doit être administré et supervisé par un professionnel de santé**.
- **Une surveillance de 30 mins** doit être respectée après administration pour écarter tout risque de réaction allergique.



### **Comment administrer le traitement Evusheld® ?**

- Administration par voie intramusculaire de **300 mg de l'association de tixagévimab et de cilgavimab**.
- Elle est effectuée consécutivement à **deux points d'injection distincts**.



### **Quel suivi post-traitement Evusheld® ?**

La durée de protection au Covid est d'au moins 6 mois. **Un suivi du dosage des anticorps tous les 3 mois doit être organisé** afin de confirmer le délai de renouvellement du traitement.

Les patients sous traitement doivent être testés contre la Covid en cas de positivité ou de présentation symptomatique évocatrice de Covid-19.



### **Comment le traitement Evusheld® est facturé ?**

Administration en intramusculaire et surveillance de 30 mins : **AMI 3 + MCI**

Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de 2 actes au plus. Le cumul MAU n'est pas autorisé.